

FIBRINOLÍTICOS PARA IAM COM SUPRA

CONTRAINDICAÇÕES

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS

- Qualquer sangramento intracraniano
- AVC Isquêmico nos últimos 3 meses
- Dano ou Neoplasia no Sistema Nervoso Central
- Trauma significativo na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses
- Sangramento ativo ou diátese hemorrágica (exceto menstruação)
- Qualquer lesão vascular cerebral conhecida (malformação arteriovenosa)
- Suspeita de Dissecção de Aorta

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

- História de AVC Isquêmico com mais de 3 meses ou patologias intracranianas não listadas nas contra-indicações absolutas
- Gravidez
- Uso atual de antagonistas da vitamina K (quanto maior o INR maior o risco de sangramento)
- Sangramento interno recente < 2 – 4 semanas
- Ressuscitação Cardiopulmonar traumática ou prolongada (> 10 minutos)
- Procedimentos cirúrgicos de grande porte dentro das 3 últimas semanas
- Punções de vasos sanguíneos não compressíveis
- História de Hipertensão Arterial crônica importante e não controlada
- Hipertensão acentuada à apresentação (PA>180x110 mmHg) e não controlada
- Úlcera Péptica ativa
- Exposição prévia à estreptoquinase (mais de 5 dias) ou reação alérgica prévia

Fonte: *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* 2009; 93 (6 Supl. 2): e179 – e264